

## Першы Беларускі Месячнік Сельскай Гаспадаркі.

### ЗЪМЕСТ:

Гаспадарка на пясках . . . . .	1
Зямляная груша . . . . .	3
Аб даходнасьці сельска-госпадарчых расьлін	4
С්вінняводства на Беларусі . . . . .	7
Некалькі слоў пра гадоўлю курэй зімой . .	9
Хваробы ў авечак . . . . .	10
Стратыфікацыя насен'ня владовых дрэў . .	13
Гаспадарчыя парады . . . . .	15
Наша пошта . . . . .	16

Цана асобнага нумару 30 гр.

**ПРЫЙМАЕЦЦА ПАДПІСКА**  
на сельска-гаспадарчую  
часопісъ  
**„САХА“**

Вышла з друку ў 1928 г.

9 кніжак.

**Падпіска** з пачатку да канца  
году каштуе 3 зл.  
з дадаткам—брашурай «Як залажыць  
каапэратыў».

Асобная кніжка каштуе 30 гр.  
з перасылкай.

У рэдакцыі можна дастаць камплект  
«САХІ» за 1927 год з дадаткам  
«У каапэрациі будучыня». Каштуе з  
перасылкай 2 зл. 25 гр.

ADRЭS RЭDAKЦYI:

Вільня, вул. Сьв. Анны 2—3.

# САХА

Першы Беларускі Месячнік Сельскай Гаспадаркі.

## Гаспадарка на пясках.

(Навазыбкаўская дасьледчая станцыя).

Пясковыя глебы пакрываюць амаль усю Беларусь. Фізычныя асаблівасці гэтых глебаў вымагаюць іншых мэтадаў апрацоўкі іх, бо ў праціўным выпадку пяскі ня толькі не аплачваюць працу гаспадара, але часта не вяртаюць яму і насеніння.

Над вывучэннем спосабаў апрацоўкі пяскоў працуе дзесяты год Навазыбкаўская дасьледчая станцыя (у Гомельшчыне), якая прычынілася да падняцца ў зроўні акалічных вясковых гаспадарак і цэлай усходній часткі нашае Бацькішчыны.

Галоўнай заганай пясковых глебаў — іх беднасць арганічнай масай. Бяз гною гаспадарыць на пясках не магчыма, а ў гаспадарцы заўсёды адчуваецца ў ім недахоп. Здавалася, што гаспадарка на пясках паставлена ў зачараваны круг, з якога нельга найсьці выхаду. Але навука звярнула ўвагу на сідэрацию (зялёнае ўгнаеніне), якая на пясках з паспехам можа замяніць хлеўны гной і гэтым самым пакрыць патрэбу пяскоў у арганічнай масе.

Навазыбкаўская станцыя цэлым чарадом досьледаў і назіраньняў знашла, што для пяскоў лепш ўсяго надаецца **лубін і сэрадэля**.

**Як сеюць лубін на станцыі?** У выніку шасьцігадовых досьледаў станцыя ўсталіла, што найлепшым часам для пасеву лубіну зьяўляецца ад 20 да 25 мая. Наогул, яго можна з паспехам сеяць ад 15 мая да 5 чэрвеня. Пасеены раней, лубін дасыпівае зарана да яго заворвання, а пасеены пазней — не дасыпее і дасьць менш зялёной масы. Усталена, што лубін дае найвязлікшую карысць тады, калі ў часе яго заворвання зярніткі ў струкох пачынаюць прыймаць бліскучы від.

На станцыі праводзіліся досьледы над жоўтым, сінім і белым адменамі лубіну. Жоўты лубін на станцыі даваў больш зялёной масы і гэтым самым лепш упłyваў на павалічэньне ўраджаю наступнага зборжжа. Але культура жоўтага лубіну вымагае ад гаспадара больш уважлівага дагляду, як апрацоўка ральлі, угнаеніне і г. д.

Каб атрымаць больш багатую зялёную масу лубіну, станцыя высывае ящэ пад лубін патасовую соль і фосфатавую муку.

Калі стаіць пагода ня спрыяючая да дасьпяваньня насеньня лубіну, станцыя часта яго жне ў той час, калі зянрё пачынае прыймаць колер высьпейшага зянрня. Лубін астравляеца дасьпявавець на ніве ў снапох. Гэтым можна прыспешыць дасьпяваньне лубіну на насеньне на 2—3 тыдні, прычым зянрё нісколькі ад гэтага ня траціць здольнасці да праастаньня.

Каб зянрё лубіну не псовалася, станцыя сачыць за яго сухасцю. Складаецца ён сухім і ў сухім месцы. Перахоўваючы пры сухіх варунках, станцыя ні аднаго разу ня мела папсаванага насеньня лубіну.

**Як сеюць на станцыі сэрадэлю.** Сэрадэля высяваецца або на асобым куску грунта, або падсываецца ў жыту, ячмень і авёс. У жыту сэрадэля падсываецца як мага раней — між 24 красавіка і 5 мая. Патрабуеца каля 3—4 пуд. на дзесяціну. Не баіца прымаразкаў, але ў першыя часы маладая сэрадэля расьце вельмі марудна. Сэрадэля ўжываецца як сялёнае ўгнаенне, таксама добра ідзе

і ў корм. Высейная ў жыту, яна не патрабуе шмат клопату і выдаткаў ад гаспадара, а таксама і асобага поля.

Сэрадэля, заворанае на зялёнае ўгнаенне, павялічвае ўраджай бульбы на 400—500 пуд. з дзесяціны.

У годы мокрыя сэрадэля рабіла лепшы ўплыў на наступны ўраджай, чым гной.

Падсеў сэрадэлі ў збожжа не адбіваецца на зъмяншэнні ўраджая апошняга. Так, на станцыі атрымана аўса без падсеву сэрадэлі 80 пуд. з дзесяціны, а з падсевам — 79 пуд.; ураджай ячменю без падсеву — 91 пуд., а з падсевам — 90 пуд.; ураджай жыту без падсеву — 87 пуд., а з падсевам — 88 пуд.

Пры пасеве ячменю ці аўса поле заразжа паслья пасеву трэба забаранаваць і, пасяўшы сэрадэлю, ізноў забаранаваць.

Сярэдні ўраджай сэрадэлі бывае каля 200 пуд. сена і 60—80 пуд. насеньня.

**Асаблівія вымаганьні лубіну і сэрадэлю.** Калі лубін і сэрадэля сеюцца першы раз, дык зямлю трэба заразіць бактэрыймі гэтых культур. Тлумачыцца гэта тым, што на карэньях матыльковых расылін, да якіх належыць лубін і сэрадэля, жывуць спэциальныя маленькія істоты (бактэрый), якія перахвачваючы з паветра азот, абагачаюць глебу гэтым найкаштаўнейшым складніком зямлі.

Галоўныя карэнья лубіну з жалвачкамі, дзе месціцца бактэрый, якія абагачваюць глебу солімі азоту.



Раз зямля гэтымі бактэрыямі не заражана, што бывае тады, калі на ёй раней не расьлі названыя расыліны, дык на карэнных лубіну і сэрадэлі бывае вельмі мала бактэрыяў і зямля слаба абагачавецца азотам. Заражэнне глебы бактэрыямі на станцыях робіцца цераз разсыпаныне на дзесяціну грунта, вызначаючы пад лубін ці сэрадэлю, 120 — 150 пудоў зямлі, узятай з поля, на якім раней гэтая расыліны высяваліся.

### **Ураджай галоўных расылін на станцыі.**

**Жыта** (па лубіне) ад 74 да 154 пуд. на дзесяціну. Чым большая маса лубіну заворана, тым большы ўраджай. Пры ўгнаені торфам: ад 48 да 106 пуд. з дзесяціны. Чым больш уносіцца торфу, тым ураджай павялічваецца.

**Авёс** (па лубіне і сэрадэлі) — ад 45 да 120 пуд. з дзесяціны.

**Ячмень** — ад 55 да 110 пуд.

**Бульба** — ад 600 да 2200 пуд.

**Турнэпс** — (кармавая рэпа) ад 3000 да 4158 пуд.

**Бручка** — каля 3500 пуд.

**Морква** — каля 2200 пуд.

На станцыі часта ўжываецца пажніўная культура — лубін, віка ў сумязі з аўсом, турнэс і інш. Гэтым станцыя, выкарыстуючы цяпло ў часе паслья жніва жыта і ячменю, здаймае з поля ў адзін год два ўраджая. Пажніўная культура даюць вельмі добрыя вынікі.

У. П.

## **Земляная груша.**

(*Helianthus tuberosus*).

Земляная груша, як расыліна мала вымагаючая ад глебы і клімату, добра надаецца да Заходняе Беларусі, дзе кармавы крызыс адчуваецца амаль штогод востра. Між тым, гэта расыліна дae на самых бедных, пясковых і нават камянісных глебах, абы ня мокрых, заўсёды добры ўраджай клубняў, якія ідуць у корм для сывінняў, кароў і коней. Калі ў добра надаецца для сіласу. Земляная груша, раз пасаджаная, трymаецца на адным месцы доўга, так што бывае яе трудна вынішчыць.

Культура зямляной грушы падобна да культуры абсыпальных расылінаў (бульбы буракоў і іншых). Калі стаіць вясна сухая, яе можна садзіць у восень. Пасаджаная вясной, груша праастае позна. Садзяць яе ў радкі ў адлегласці 60 ст. і ў радку клубень ад клубня — 40 ст. Можна ў мэтах эканоміі матэрыялу садзіць парэзанымі клубнямі. Пазней груша сама разрастаетца і трymаецца на адным месцы некалькі гадоў.

Пры ўправе грушы, трэба сачыць, каб зямля была чыстая ад сарнякоў і ўспульхненая. У ліпні м-цу груша так разрастаецца, што зямлю цалком засяяне і далейшая ўправа

землі не патрэбна. У наступныя гады дагляд за грушай заключаецца ў тым, што яе вясной барануюць, потым абсыпаюць зямлёй. На ўгнаеніне добра адклікаецца. Патрабуе ўгнаеніня адналькавага з бульбай.

Груша стаіць зялёной аж да самых марозаў. Клубні часта выбіраюцца вясной, бо ў зямлі яны лепш перахоўваюцца чым у капцах. Такім чынам яны ідуць у корм жывёле тады, як у гаспадарцы бывае найвастрэйшы крызы ў корме.

Дзякуючы такім асаблівасцям груши, яе часта садзяць на адлеглых кускох, ня ўводзячы ў севазварот. Глебы самыя бедныя, абы не балоцістыя і моцна съязлывыя—будуць добра надавацца да культуры груши. Калі гаспадар пажадае даць угнаеніне пад грушу, дык тут кошт заўсёгды вяртаецца.

Нашым сялянам, у якіх часта зямля ўщмат дзе ляжыць пусткай, а кармавы крызы — звычайнае зявішча, трэба больш засікавіцца гэтай расылінай і пачаць яе зарадзіць у сябе. Думаю, што спробаваўшы пасадзіць грушу і ўмелы скарыстаўшы клубні і зялёную надземную масу на сілас, гаспадар хутка пакахае гэтую расылінку і адвядзе на сваіх ніўцах ей больш пачэнснае месца.

Б.

Зямляная груша.

пасадзіць грушу і ўмелы скарыстаўшы

надземную масу на сілас, гаспадар хутка пакахае гэтую расылінку і адвядзе на сваіх ніўцах ей больш пачэнснае месца.

## Аб даходнасці сельска-гаспадарчых расылін.

Каб задаволіць свае патрэбы, як праждыўленіне сям'і, патрэба ў корме для ската і г. д., гаспадар высявае на полі не адну—дзіве расыліны, а некалькі. Павялічваць лік культур на полі прымушаюць гаспадара і тыя абставіны, што пры некалькіх разнародных культурах больш правільна разъмяркоўваеца праца яго сям'і ў працягу цэлага году.

Калі мы прыгледзімся да даходнасці паасобных нашых расылін, дык нават пры павярховым назіраньні можна зауважыць, што на ўсе культуры даюць нашаму гаспадару аднолькавы даход, як роўна на ўсе яны патрабуюць адноль-



кавай працы, якая па разнаму разъмяркоўваеца па месяцах году.

На гэта нашы, нават і перадавыя, гаспадары мала звярачваюць увагі; між тым пры організацыі ці пры пераорганизацыі сельскае гаспадаркі прыходзіцца больш уважліва лічыцца з гэтymі асаблівасцямі паасобных расылін і выбіраць з іх найбольш рэнтабельныя, гэта значыць, такія, якія пры ўсіх іншых аднолькавых умовах даюць гаспадарцы найвялікшы даход. Рэнтабелнасць нашых культур і выбар ададпаведнага мясцовым умовам агульнага гаспадарчага кірунку—вось два шляхі, па якім можна вывесці наша кволае земляробства з яго занядбу.

У гэтым нарысе мы разгледзімо прыбытковасць найбольш распаўсядженых на Беларусі культур: *жыта, аўса, бульбы і лёну*<sup>1)</sup>.

Прыбытак будзем зваць *агульным*, калі ацэньваюцца прадукты культуры бяз выдаткаў і *ўмоўна-чыстым*, калі прыбытак бярэцца за вылічэннем галоўных выдаткаў, як напрыклад: каштоўнасць насеніня, апрацоўка і ўгнаеніне ральлі, здым ураджаю, амортызацыя<sup>2)</sup> сельска-гаспадарчых машын, прыладаў і будынкаў і г. д. Тут мы не бяром пад увагу кошт працы самага гаспадара і яго сям'і, што трудна паддаецца вылічэнню, а па другое—аслажніла-баглід разглядываемай тэмам. Дзеля гэтага і даход ад культуры будзе не абсалютна, а *ўмоўна-чысты*. Ніжэй пададзеная табліца паказвае, колькі кожная расыліна дае ў жытніх адзінках (жытняя адзінка — 1 пуд жыта) даходу і выдаткаў:

Назоў культуры	Агульнага	Ўмоўна-чыстага	Выдаткі
Жыта . . . . .	75	46	29
Авёс . . . . .	81	54	27
Лён . . . . .	100	74	26
Бульба . . . . .	174	98	76

Як бачым з табліцы, найвялікшы прыбытак у ўмовах гаспадараванья на Беларусі дае бульба, потым лён, авёс і нарэшце жыта. Па выдаткам бульба таксама займае ў нашым прыкладзе першае месца. Гэта тлумачыцца тым, што пад бульбу клалася ўгнаеніне, а потым бульба вымагае

1) Вылічэннямі карыстаюся дадзенымі з досьледаў над селянскай гаспадаркай Беларускага Нар. Ком. Земляробства.

2) Адлічэніе проц. на пакрыццё каштоўнасці рэчы.

шмат конскай працы, якая тут пераводзіцца на кошт жытнай адзінкі і прыймаецца ў рахунак. Невялікі выдатак на лён тлумачыцца тым, што на культуру лёну і выраб валакна не бралася пад увагу праца гаспадара і яго сям'і. Авёс па прыбытковасці займае трэцяе месца. Гэта съведчыць, што на продаж шмат дзе будзе сеяць карысным не авёс, а лён. Жыта займае апошніе месца. Здавалася-б, што плошча яе павінна была-б зьменшвацца за шмот больш прыбытковай культуры, як лён. Але тут стаіць на перашкодзе разъмеркаваньне працы па месяцах году, што прымушае гаспадара не закідаць гэту культуру іншымі. Цяпер разгледзімо разъмеркаваньне працы над кожнай расылінай па месяцах.

Табліца паказвае, колькі ідзе мужчынскіх дзён на кожны месяц на асобную расыліну пры ўмовах гаспадаркі на Беларусі:

Назоў расыліні	Кра- савік	Май	Чэр- вень	Лі- пень	Жні- вень	Вера- сені	Каст- рыч- нік	Лістапад	Усяго
Жыта	0,42	0,28	2,81	8,64	9,45	3,76	3,87	4,24	33,47
Авёс	5,30	5,0	0,70	0,55	6,66	4,35	3,09	8,57	34,22
Бульба	13,19	15,13	7,1	2,11	2,58	35,23	1,92	0,12	77,38
Лён	5,86	8,78	19,99	0,07	21,56	30,1	40,96	19,25	146,57
Трава	2,86	1,43	1,32	6,78	2,65	1,85	1,54	0,85	19,28

Як бачым, жыта ў нашым прыкладзе вымagaе менш за ўсе расыліны працы: тлумачыцца тым, што ўгнаенне клалася не пад азіміну, а пад бульбу. Лён вымagaе найбольшага ліку рабочых дзён.

Цяпер, калі мы падзелім умоўна-чысты прыбытак ад кожнае расыліны, дык атрымаем аплачываемасць людзкой працы. Бачым, што 1 рабочы дзень у сярэднім аплачываецца ў жытніх адзінках:

На лёну . . .	0,44
" бульбе . . .	1,30
" жыце . . .	1,40
" аўсе . . .	1,63

Найменш апачавае рабочы дзень, як відаць з табліцы— лён, які патрабуе найбольшы лік рабочых дзён.

Пры арганізацыі гаспадаркі гэту аплачываемасць працы чалавека рознымі расылінамі трэба браць пад увагу там, дзе гаспадар прымушаны карыстацца наёмнай працай і ўводзіць у севазварот такія расыліны, якія-б давалі найвялікшы прыбытак, бяручы пад увагу мясцовыя ўмовы.

П.

## Што рабіць з прымерзшай бульбай.

Часта здараецца ў гаспадарцы, што бульба пры неад-паведным перахоўваньні яе зімой прымёрзае. Далей такую бульбу перахоўваць нельга, бо сама згніе і гніеньне пашырыцца на ўесь капец.

Калі бульба прымерзла шмат і гаспадар яе зараз-жа ужыць для корму скаціне ня зможа, дык такую бульбу пажаданна „заквасіць,” ці сіласаваць. Дзеля гэтага бульбу трэба абмыць і, ачышчаную ад зямлі, ссыпаць у сіласную яму. У яме бульбу сякуць сякачом на 2-3 часткі і потым ту-га прыбіваюць таўкачом. Калі слой убітай так бульбы дасягае таўшчыні якіх 6 цалі, ізноў прыбіваюць, кладуць слой бульбы і робіць, што з папярэднім слоям. Як сіласная яма запоўніцца, дык верх трэба зрабіць як дах, каб вада магла съцикаць. Па мякіне і саломе кладуць слой зямлі таўшчынёй каля 1 аршыну. За такімі сіласамі трэба пільна наглядадзі і, як толькі зьявяцца шчыліны, ці дзіркі — зараз-жа засыпаць, каб гэтым не дапусціць паветра ў капец.

Такой заквашанай бульбай можна карміць усялякую жывёлу. Да сіласу можна дадаць кухоннай солі (на 1 пуд бульбы 1 хф. солі), але не абавязкова, бо бульба добра сіласуецца і бяз солі, хаця скаціна паядае солены сілас ахвятаў.

Так я заўсёды ужываю прымерзлую бульбу, дзеля чаго спэцыяльна збудоваў бэтонны сілас, хаця на першых парах сіласаў бульбу ў ямах, выкананых на высокім месцы, каб ня падашла вада. Ямы капаў глыбінёй каля 1 арш. з прастымі съценкамі і грунт стараўся выбіраць з глінай. Шырыня і даўжыня ямы залежыць ад колькасці сіласаванага матэрыялу.

*Пляхтур.*

## С্বіньняводства на Беларусі.

Прыродныя варункі Беларусі спрыяюць гадоўлі с্বіньней, якія па здольнасці перарабляць прадукты гаспадаркі ў мяса і сала займаюць першае месца сярод іншых жывёлін. Практыкай і шматлічебнымі досьследамі даведзена, што с্বіньня на адзін фунт прыросту ў сваём целе патрабуе корму амаль у 3 разы менш, чым карова. Калі ўзяць пад увагу тое, што с্বіньні для свайго жыцця і адкорму патрабуюць, на раду з іншымі кармамі, і сельска-гаспадарчыя адкіды, перарабляючы іх у прадукты высокай вартасці, як сала, мяса, шэрсьць, дык карыснасць с্বіньняводства ў нас будзе яшчэ больш зразумелай.

Шкада, мы да гэтага часу, калі і пашыраем гэту галіну гаспадаркі дык больш лічэбна, чым якастна, дзякуючы чаму мы ня здольны вясьці канкурэнцыю дома з прадуктамі сывінняводства загранічнага паходжаньня. Амэрыканскэ сала, будучы прывезена з-за акіянаў і прашоўшы ўсе та-можні, часта выцясьніе ў нас мясцовае сала, якое і па якасці і нават цане ня можа выдзяржаць канкурэнцыі з за-граніцай.

Зразумела, што амэрыканскія гаспадары, ладуючы ка-раблі саламі і, высылаючы іх да нас, на гэтым ня думаюць нясьці страту. Там ужо наперад вырахавана, па якой цане можна прадаць свае прадукты, каб аплациць кошт утры-маньня і адкорму жывёліны і плюс да гэтага штосьці за-рабіць.


У чым тут сякрэт? Замежныя гаспадары даўно зьвяр-нулі ўвагу на сваё сывінняводства і старанным падборам расы і індывідаў дасягнулі ў гэтым напрамку значных пась-пехаў. Там усё выкідываецца, што не аплачваецца дзяржаць, а рацыянальнае кармленыне скажыны дае магчымасць ім выкарыстоўваць жывёлу, як найлепшую машыну для пера-робкі корму і гаспадарчых адкідаў у прадукты высокай вар-тасці, якія лёгка транспарціруюць да самых далёкіх куткоў зямной кулі.

Калі прыглядзецца да нашага сывінняводства, дык трэба прызнацца, што праца нашых перадавых гаспадароў, вызываўшыхся з традыцыйных старадаўніх звычаяў, яшчэ ня мае ясна акрэсліянага пляну. Мы часта ганяемся за расавымі сывіннямі, якія будучы скорасьпелымі, менш патра-буюць корму, як для свайго ўзросту, таксама і адкорму. Але з практикі чуваць усё часцей галасы, што расавыя сывінь-ні трудней адкармліваюцца на сала, чым мясцовыя гатункі, а здатнасць іх да розных пошастных хваробаў у нас стаіць шмат вышэй за мясцовых сывінней. Гэтыя факты, здаецца, гавораць, што чурацца зусім мясцовымі гатункамі сывіннай пакуль што ня прыходзіцца. Маём мы пад рукой каштоўны матэрыял у пастаці беларускай вялікай доўгавухай сывінні. Калі да яе даліць крыўі скорасьпелых сывіней, дык трэба чакаць, што маглі-б вывесці гатунак найлепш падаючыся да нашых умоў.

Цяпер з'вернемся да адкорму сывінні ў нас. Тут, лагодна кажучы, нашы гаспадары часта ня маюць ніякага паняцця аб кармленыні наогул жывёлы, а асабліва сывін-ней па нормам. Пры адкорме корм задаецца ўволю і адна-стайны, ад чаго сывінням ён хутка прыкрае і яны пера-стаюць яго ахвота паядаць, што зацягвае пэрыяд адкармлі-ванння і гэтым самым ударажает адкорм.

Па адозве нашых лепшых гаспадароў і па май улас-ным назіраньням, часта пасъпех адкорму залежыў ад разна-

стайнасьці ў кармавой дачі розных гатункаў кармоў з прыбаўкай макухі. Сьвіньні ахвотна паедалі такі корм, калі ён задаваўся па нормам, лепш (папраўляліся, хутчэй адкармліваліся) і гэтым самым адкорм сьвіньні каштаваў гаспадару дзяшавей.



Вызначэнне вагі сьвіньні абмерам.

Пільнуючыся правілаў адкорму па нормам, гаспадар павінен сачыць, каб сьвіньня ахвота корм паедала, але не пакідала яго ў карыце.

Пры адкорму сьвіньней трэба іх часта важыць. Калі ў гаспадара няма вагі дык вагу можна вызначыць абмерам. Дзе-ля гэтага бяруць тасьму, падзеленую на цалі, меруць сьвіньню ў грудзёх і сыпіну ад патыліцы да пачатка хваста, як паказана на рисунку.

Атрыманыя лічбы ў цалях множаць адна на другую і здабытак ад множання дзеляць:

калі сьвіньня тлустая — на 9,

калі сьвіньня па тлустасці сярэдняя — на 10

і калі сьвіньня худая — на 11.

Атрыманыя пасъля дзяленьня лічбы і дадуць вагу сьвіньні ў фунтах.

У. П.

## Некалькі слоў пра гадоўлю курэй зімой.

У нашае вёсцы куры часта зьяўляюцца якойсьці карай гаспадара. Летам яны, калі і нясуць яйкі, дык часта затое прыносяць вялізную шкоду на гародзе і ніве. Зімой курэй засаджваюць у „турму“ — падпечак, дзе яны дтстануць розныя хваробы і на вясну падыхаюць.

Між тым, досыць палажыць тут трохі працы і дагляду, як гэтыя маленькія жывёлы могуць прынесці гаспадарцы

значны даход. Перш-на-перш, з надыходам зімы мы мусім курэй тримаць не падпечкам, дзе яны робяцца кволымі і аб нёскасьці іх няма мовы, ды апрача таго псуюць паветра ў жылых памяшчэннях, а збудаваць некаштоўны курнік, у якім ня трудна забясьпечыць курам хаты трохі цяпла, прынамсь на нач. Калісі думалі, што ў курніках трэба было рабіць печы, пры дапамозе якіх аграваць іх. Цяпер пераканаліся, што гэта ня толькі памагае, але нават шкодзіць, бо курыца, выбегаючы з цёплага памяшчэння на мароз — прастуджвалася.

Для курэй выстарчае, калі ў курніку столькі цяплыні, калі там вада не замярзае. А такую цяплыню куры самі сабе ствараюць, калі курнік шчыльна збудаваны і цераз шчэлкі ня дуе вецер да сярэдзіны. Дзеля гэтага цяпер, з падыходам зімы, трэба апакляваць курнік, на сталаўаньне палажыць саломеняя маты і моху, добра прытасаваць дзвевы. Каб яшчэ лепш захаваць цяпло ў курніку, трэба ў вялікія маразы дадаць сувежага конскага ці авечага гною, які агравае паветра.

У марозныя дні курэй ня варта выпускать на панадворак, а тримаць іх у памешканьні, даючы ім капацца якога-небудзь корму. Важна, каб у гэты час куры даставалі такі корм, які грэе курыцу, напр. ячмень з мякінай. Карысна даваць да корму мясной і касцянай муکі, або замест іх — макухі з дамешкай пашнай вапны.

Шкодна дазваляць курам есьці сънег або лёд, ад чаго куры хутка захварваюць. Ім треба раз на дзень даць вады з хатній тэмпэратурай.

Вось так, калі мы будзем даглядаць сваіх курэй, дык яны будуць ня карай гаспадара і на іх будзем пасылаць не каршуна, а звычайна — купца. Замест прыкрасыці, яны прынисуць гаспадарцы карысьць. Праца ня хітрая, ня складная, а ўдзячная, а асабліва зімой, калі цэны на яйкі высокія.

*K. K.*

## Хваробы ў авечак.

Авечкі, як ведама, часта хварэюць на тыя самыя хваробы, што і кожная іншая жывёла. Толькі ў авечак ёсьць пэўныя хваробы, ад якіх яны больш церпяць і якія выклікаюць паміж імі значныя страты.

Дзякуючы таму, што авечак разводзяць дзеля воўны і аўчыны,—*на скуркыя* хваробы ў іх займаюць першае месца і патрабуюць да сябе найбольшай увагі. Зразумела, што і ўсе іншыя хваробы, асабліва хранічныя, якія зьнясіляюць авечак, таксама павінны цікавіць кожнага гаспадара ня толькі таму, што хворыя мізарнеюць і трацяць мяса, але

і таму, што ў іх псуецца воўна пад час хваробы. Ня трэба ўжо казаць, што заразълівия хваробы, так зв. пошасьці, якія нападаюць на авечак, як і на кожную іншую жывёлу, павінны цікавіць гаспадара ня толькі таму, што ад іх гінуць тыя, што захварэюць, але і таму, што зараза ад авечкі можа перайсьці на іншую свойскую жывёлу і пацягнуць за сабою вялікія страты, пашырыўшыся на значныя абшары.

Тут мы разгледзім толькі некаторыя авечныя хваробы, якія досыць часта сустракаюцца ў авечак.

**Катар носу.** (цеча з носу) бывае досыць часта ў авечак, то ў лёгкай форме, то ў больш-менш цяжкай. Тая і другая форма катару бывае найчасцей ад застуды, ад пылу і часамі адразу захоплівае шмат авечак. Найбольш церпяць ад катару ягніты і слабыя авечкі, яны хутка зьнясільваюцца, дрэнна растуць і робяцца кволымі. Катар з носу можа перайсьці на горла і на вочы. Хворыя авечкі пры гэтым чхаюць, сапуць, трацяць жуйку, у іх зъяўляецца гарачка, затрыманыне жалудку часта зъменявае панос, сілы слабеюць, авечкі больш ляжаць і мізарнеюць. Перад съмерцю зъяўляюцца сутаргі.

Лечачь катар прамываньямі носу рашчынай борнага квасу (1 гарбатную лыжачку б. квасу на шклянку вады). Захварэўшых аддзяляюць у больш цёплы і сухі хлеў, паляпшаюць ім корм і агульныя ўмовы ўтрыманьня.

**Авечы авадзень**—таксама выклікае катар носу. Гарачым летам, у сярэдзіне альбо ў канцы лета, па ўзылесьсю лётае шмат авечых аваднёў, саміцы якіх запаўзаюць авечцы ў нос і там пакідаюць свае яйкі. Праз некатары час з гэтих яек вырастаютъ чарвячкі вялічынёю з боб, якія паўзуть глыбей, у верхнюю частку носу, нават запаўзаюць ў лобавыя і рагавыя пазухі і сядзяць там месяцы 3—4. Калі чарвячкоў гэтага авадня народзіцца ў носе шмат, то авечкі ад іх вельмі церпяць і нават прападаюць. З носу ў такіх авечак бесперастанку цячэ гной, яны ходзяць хістаючыся і спусціўшы ўніз галаву.

Выгнаць аваднёвых чарвячкоў з носу няма як, нікімі спосабамі іх нельга адтуль дастаць. Каб папярэдзіць гэтую хваробу, радзяць ў гарачую пару, у сярэдзіне і ў канцы лета, не пасьвіць авечак паблізу лясоў; насы ў авечак называюць дзёгцам, крэолінам з ільняным маслам (1 ч. крэоліну на 10 ч. масла) карасінаю і наагул сродкамі з моцнымі пахам, які адбіваў-бы аваднёў. Таксама вельмі карысна рабіць венікі з квітучага палыну; высушыўшы іх у цяньку, мачаюць у чисты дзёгаць і ўсьлед выкачваюць у дробнай звычайнай солі; гэткія венікі развесшваюць у аўчарнях і час-ад-часу ўзнаўляюць. Авечкі з вякікаю ахвотаю ліжуць гэткія венікі і нават абрываюць іх: гэта ня толькі перасцярагае іх ад аваднёў, але таксама карысна і супроць другое пашы-

ранае ў нас на Беларусі авечас хваробы — супроць так зв. „матыліцы“ альбо „мятлушки“ (пячонкавага двуроту).

„Матыліца“ пануе на нізкіх балоцістых мясцінах; у некаторых мясцох ёю заражаны да 60 проц. авечак і дзеля того, што глісьцюкі, якія яе выклікаюць, сядзяць ў печанёх, барацьба з гэтаю хваробаю лекамі амаль што немагчыма. Сяляне самі прабуюць ужываць пры гэтай хваробе розныя спосабы, як напр. у некаторых вёсках хворым авечкам даюць халодную чыстую воду і канаплянную мякіну. У апошнія часы заграніцаю знашлі новае лекарства проці „матыліцы“ — „Дысталь“, якое нібы дае добрыя вынікі. Галоўнае пры гэтай хваробе — гэта асушка канавамі і дрэнамі балотаў і пасыпка авечас пашы вапнаю, ад чаго зародкі глісьцюкоў „матыліцы“ — зьнікаюць.

„Валасень“ — так заве́цца хвароба, што выклікаецца цененъкімі, як волас, глісьцюкамі (валасьня), які ў значным ліку часамі трапляе ў гарлянку і ў дыхальныя дудачкі (так зв. бронхі) авечкам. З кашлям гэтыя глісьцюкі разам з яечкамі выхарківаюцца авечкамі і трапляюць у лужыны, крыніцы і наогул на мокрыя мясціны, якіх уюды шмат знаходзіцца на балотах. Там, у вадзе, з гэтых яечак вырастоюць глісьцюкі — „валасьня“, якія потым, калі авечкі пьюць гэткую заражаную воду, разам з вадою трапляюць да здаровых авечак і заражаюць іх. Заражаныя авечкі моцна кашляюць, цяжка аддыхаюць, трацяць апэтыт, слабеюць і часта прападаюць ад зьнясілення. Раабліва церпяць ад валасьня маладыя авечкі і ягняты, якіх часта прападае добрая палаўіна.

Лячэнье ад „валасьня“ лекамі нязвычайна нявыгодна і патрабуе ўдзелу вэтэрынара. Спачатку хваробы радзяць абкурываць хварых дымам з пад ялаўцу, з пер'я, або з рогу; абкурваюць іх у шчыльна зачыненым хлеве і трymаюць авечак у гэткім дыме мінут 15, ня болей.

*Перасцярога.* Ягнят, і наогул авечак, ня радзяць пасьвіць па мокрых і нізкіх мясцінах, асабліва падчас дажджоў. Ягнят у вільгаць найлепш трymаць на сухім корме, альбо перад выганам на пашу падкармліваць сенам і выганяць у поле, напаіўши іх дома, каб авечкі ня кідаліся да кожнае лужыны. Нізкія, зaimшэлые мясціны і выганы, а таксама вялікія лужыны там, дзе пасуцца авечкі, належыць абсушваць канавамі і дрэнамі, каб зьнішчыць зародкі ўсякіх глісьцюкоў. Гной, дзе стаяць хворыя авечкі, карысьней спаліць.

„Вярцячка“ — хвароба, пры якой авечкі кружкацца на вокал сябе. Вярцячка ў авечак бывае ад того, што ў мазгі да іх трапляе часамі зародак істужкавага сабачага рабака (ланцужнага мазгавіка), які звычайна жыве ў іншых сабак. Авечкі зъядоюць яечкі гэтага рабака разам з травою, забруджанаю сабакаю, якая мае ў сабе гэтага рабака. У жываце

авечкі з яечак вылупляеца зародак рабака; ён прасьвідроўвае съценку жалудка, трапляе ў кроў і крывёю заносіцца ў мазгі авечкі; тут, у мазгох ён затрымоўваеца і жыве аж да саме съмерці авечкі, — гэтым і выклікаеца вядомая ўсім хвароба, т. зв. „вярцячка“ авечкі. Сабакі, якія зъядаюць мазгі хворае авечкі, заражаюцца ад іх гэтым рабаком і з свайго боку заражаюць потым авечак яечкамі гэтага рабака.

Хворыя авечкі спачатку хутка томяцца, адстаюць ад статку, робяцца пужлівымі, вочы ў іх набягаюць крывёю, лоб робіцца гарачы і авечкі, трацячы прытомнасьць, кружацца, або стаяць упёршыся ў съцену лобам ці бегаюць, як няпрытомныя, спусьціўшы галаву ўніз або схіліўшы яе на бок. Часамі, асабліва ў ягнят, хвароба выяўляеца спачатку кволасцю ў задзе, хворыя ходзяць хістаючыся на зад, спатыкаюцца і нарэшце ў іх параліжуе ўсю заднюю частку цела. Наогул, захварэўшыя на „вярцячку“ авечкі гінуць ад зъясілення і палярушу мазгоў. Калі абмацаць рукамі галаву хворае авечкі, то можна заўважыць у яе на галаве неялічкі выпух, націснуўшы на які лёгка выклікаецца боль і супаргі ў хворае авечкі.

Лечаць хворых на вярцяцку авечак, робячы ім операцыю на галаве і дастаючы з мазгоў зародак рабака (авечы мазгавік). Але гэтая операцыя не заўсёды дадае добрыя вынікі.

Перасцярога пры гэтай хваробе мае большае значэнне. Кожную вясну і восень неабходна выганяць рабакоў з сабак. Сабакам даюць 4 разы на дзень, праз кожныя 4 гадзіны, па гарбатай лыжачцы парашку з карніявішча папараці; праз 6 гадзін паслья апошняе лыжачкі папараці даюць 2—3 лыжкі рыцыны ці алею. Калі з рабакамі і галовы авечак, якія прападуць ад „вярцячкі“, належыць спаліць.

„Плуг“ № 2, 1926 г.

## Стратыфікацыя насення пладавых дрэў.

Садоўніцтва на Беларусі пашыраеца. Сяляне пачынаюць цікавіцца гэтай галінай гаспадаркі. Папыт на прышчэпы павялічваеца. Добра пастаўленыя садовыя ўстановы цэны на дрэўцы павышаюць. Гэта часта прымушае нашага селяніна набываць прышчэпы на бліжэйшых кірмашох. Затраціўшы гроши, селянін хутка пераконваеца ў tym, што яго на кірмашы невядомы „садавод“ ашкуаў, прадаўшы неадпаведны гатунак дрэва, ці ня здольнае да жыцця.

Прайшло даволі часу, гаспадар чакае пладоў, а замест іх — або прыходзіцца высякаць высахшае дрэўца, або апошніе дае дзікія плады. Гэтыя факты, якія часта можна назіраць у нас, павінны прымусіць нашых гаспадароў заніцца вырашваньнем прышчэпаў у сваёй гаспадарцы. Справа ня выма-

гае шмат коштаў, досыць толькі, каб пачынаючы садавод запасця адпаведнай ведай.

У гэтым нарыйсе я хачу пазнаёміць нашых чытачоў спосабамі пераходу ваньня насеньня яблыняў і ігруш пры дапамозе стратыфікацыі.

Насе́ньне пладавых дрэў уладаюць тымі асаблівасцямі, што, пасеяныя вясной без адпаведнага іх перахованья, часта губляюць здольнасць праразтаньня. Дзеля гэтага іх лепш высываць на пладовую ляху ўвосень (верасень і кастрычнік м.-цы). Гэта-ж робіцца і сама прырода. Але бываюць выпадкі, што аматар-садавод ня ўсьпее пасеяць насе́ньне ўвосень, або каля пладовай школкі расплодзіліся мышы, якія вельмі ласы на насе́ньне і іх цалком за зіму паядаюць у зямлі — тады прыходзіцца задавольніцца пасевам вясной.

Каб насе́ньне дрэў за зіму не страціла здольнасці праразацца, іх стратыфікуюць. Раблю я гэта так: бяру пасуду з дзіркамі на дне, каб магла працякаць вада ад паліўкі, кладу на дно чарапкі, насыпаю на іх слой пяску таўшчынёй  $\frac{1}{2}$ —1 вярш., на гэты слой кладу слой насе́ньня так, каб скрозь іх можна было бачыць слой пяску, ад ступаючы на  $\frac{1}{2}$  вяршка ад съценак пасуды. Гэта робіцца для таго, каб каля съценак насе́ньне не прасыхала. Потым насыпаю ізноў слой пяску таўшчынёй  $\frac{1}{2}$ —1 вяршок, на яго ізноў насе́ньне і так аж да самага верху пасуды. Верхні слой мусіць быць з пяску таўшчынёй 1 вяршок.<sup>7</sup> Пасуду закрываю ад мышэй і ад прасыханья і стаўлю ў халоднае месца—склеп. Зімой сачу, каб насе́ньне не псовалі мышы і не прасыхалі.

Здараецца, што ў сакавіку месяцы насе́ньне пачынае ў пасудзіне праразацца, а зямля на лясе яшчэ не адтаяла. У гэткім выпадку я вынашу пасудзіну ў халоднае месца, дзе затрымліваю працэс праразтаньня. Калі здараецца, што час пасеву надышоў, а насе́ньне яшчэ не праразае, дык гэтае праразтанье ўскараю паліўкай іх цяплаватай вадой. Падгатоўленыя такім спосабам (стратыфікацыяй) насе́ньне даюць дружныя ўсходы, ня горшыя чым пасеяныя ўвосень.

Адначасна пераходу насе́ньне і наступным спосабам, які практыкуецца ў мяне ў працягу 10 гадоў. Я пераходу частку насе́ньня не ў закрытым памяшчэнні, а ў зямлі. Для гэтага выкапваю яму ў школцы, куды і стаўлю пасуду і закапваю яе тут так, каб пакрышка зямлі над пасудай была ня менш 8—10 вярш. Гэты спосаб яшчэ больш выгадны, бо не вымагае дагляду за страфіцираваным насе́ньнем.

У наступных нумарох „Сахи“ пагутару аб падрыхтоўцы зямлі ў школцы, аб самым пасеве насе́ньня, даглядзе за дзічкамі, прышэлкай іх і г. д.

*Садавод.*

## Гаспадарчыя парады.

**Пытанье.** Маю добрую карову, але ўжо другі год, як ня целіца і ня прыходзіць у „ахвоту“. Парадзьце, ці ёсьць спосаб прымусіць карову прыняць быка?

**Падпішчык Сяргей Масюк.**

**Адказ.** З Вашага пытаньня ня можна відзець, у якім стане знаходзіцца карова. Часта каровы ня прыймаюць быка дзякуючы агульнаму аслабленью ці хваробе спэцыяльных палавых органаў. Адпаведнае кармленьне і лячэнье хваробы хутка прыводзіць карову ў такі стан, калі яна патрэбует быка.

Калі тут прычынай не дапусканьня каровай быка ёсьць не хвароба, дык часта гаспадары прымушаюць карову „прысьці ў ахвоту“ прыбліжэннем быка да такой каровы. У коры карове пажадана даваць ільняной макухі, кухонай солі. Крыж націраюць съпітрам.

Некаторыя гаспадары раюць даваць карове хлебны квас.

**Пытанье.** Ці ёсьць спосаб атучыць каня кусацца?

**Падп. Адам Сарока.**

**Адказ.** Нораў у каня — кусацца часта зъяўляецца вынікам дрэннага абходжаньня з ім змалку, хаця бывае, што гэты нораў перадаецца ў спадчыну.

Прывычка каня кусацца даецца з вялікім трудом атучыць. Не памагае тут біцьцё каня, ад чаго ён яшчэ больш злуеца і больш кусаецца, мала памагаюць і ахраныя аброці і кошыкі.

Часта атучаюць каня кусацца пры помачы гарачае морквы, саланіны і нават — металу, але гэты спосаб ёсьць дзікі, які можа часам пашкодзіць здароўю каня.

Некаторыя гаспадары рэкамэндуюць атучваць каня пры помачы гнілога і съмярдзючага мяса. Конь, маючы далікатныя, схваціўшы ў часе злосці зубамі за такое мясо, чуе страшеннную агіду, што можа прымусіць яго адзвычаіцца ад кусаньня.

Спрабуйце гэты спосаб, які ня шкодны дзяя здароўя каня і вельмі просты. Пажадана было-б, каб Вы падзяліліся з вынікамі гэтаяе пробы з чытачамі „Сахі“

**Пытанье.** Калі лепш сеяць насенне яблыні і грушаў?

**Падпішчык А. Сыч.**

**Адказ.** Насенне плодовых дрэваў сеюць увесень і вясной. Калі садавод баіцца, што ў весень могуць папсаваць у зямлі мышы, дык пасеў лепш рабіць вясной. Зімой насенне яблыні і грушаў пераходзіваеца з пяском (1 частка насення і 5 часткаў пяску), з якім насенне добра перамешваеца і ставіцца ў пасудзіне ў кусты. Рана вясной на-

сеньне адсяваюць на рэшаце ад пяски і сецца на лехі. Як насеньне прарасьце і зывіцца 2 лісткі — расылінку хмарнай пагодай перасаджваюць у школку. Падросшыя дзічкі пажадана паліваць жыжай з птушынага гною, да якой дамешваюць печнага попелу і негашанай вапны (1 частка сухога гною, 100 частак вады, 2 часткі попелу і  $\frac{1}{5}$  частка вапны).

Практыка ўсталіла, што для вырашчыванья дзічкоў лепш надаецца насеньне дзікіх яблынь і грушаў, ад якіх вырастоюць дрэвы з сільнай карнявой сыштэмай.

**Пытанье.** У нашае ваколіцы зъявілася хвароба, пры якой рот, вымя і капыты пакрываюцца балічкамі. Што гэта за хвароба і як з ёй змагацца?

### A. Саколік.

**Адказ.** Трэба думачы, што ў Вас зъявіўся яшчур—страшная хвароба ня толькі для жывёлы, але і для людзей. Зараз-жа трэба зъвярнуцца да вэтэрынарнага дохтара і абвясціць бліжэйшай адміністрацыйнай уладзе.

Высылаем Вам 5—кніжку „Сахі“ за 1927 год, дзе падрабязна пазнаёміцеся з гэтай хваробай. Шкода, што Вы ня выпісалі камплект „Сахі“ за 1927 г. (каштуе 2 зл. 25 гр.).

## Наша пошта.

**Якімчыку С., Плікану Я., Асіповічу Я. і іншым.** „Саху“ Вам кожны раз высылаем акуратна. Думаем, што прычына не акуратнага атрымліванья Вамі часопісі заключаецца не ў абмылцы адміністрацыі „Сахі“, якая пільна сачыць за экспедыцыяй. Палеонымі друкамі „Саху“ высылаць не акупаецца, бо перасылка кожнага нумару абышлася-б 45 грошаў, што шмат ударажыла-б выданье.

Змагайцеся з гэтым злом на мясцох. Калі будзе фактычна даведзена злая воля ў не акуратным Вамі атрымліваньні нумароў „Сахі“ з боку пошты ці гміны, дык пажадана гэты факт запратаколіць і пратакол, падпісаны съведкамі — пераслаць у рэдакцыю.

Мы стараемся даслаць часопіс пайторна, але гэта балюча б'е па кішэні і да таго беднай нашай рэдакцыі.

**Шалею I.** У рэдакцыі пераходзяцца ўсе нумары за 1928 год і цэлы камплект, за вынікамі першае кніжкі за 1927 год. Каштуе камплект за 1927 г. 2 зл. 25 гр. з перасылкай.

**Сурку В.** „Саха“ дарма высылацца ня можа. Думаецца, што цана — 3 зл. у год даступна найбяднейшаму гаспадару. Калі ён будзе зацікаўлены ў падняцьці даходнасці сваей гаспадаркі і ў адраджэнні нашага земляробства, дык пастараецца выпісаць сам і другім парайць.

Адрэс Рэдакцыі і Адміністрацыі — Вільня, вул. Св. Анны 2-3  
Выдавец і Рэдактар А. Уласаў.

в ы ш л і  
з д р у к у  
і прадаюцца

**Беларускія Календары:**  
**АДРЫЎНЫ** – 1 зл. 40 гр.  
**КНІЖКА** – 2 зл. 50 гр.

Календары маюць багаты  
сельска-гаспадарчы аддзел.

ХТО ВЫПІСВАЕ БОЛЬШ 10-ЦІ ЭКЗЕМЛЯРАЎ –  
АТРЫМЛІВАЕ СКІДКУ.

ГАЛОЎНЫ СКЛАД:  
**Вільня, Вострабрамская 1.**  
**Беларуская кнігарня.**

